



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، دانشگاه آموزشی

شماره ۱۶۶۱۰ -  
تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۴  
پیش ..... خارجی

معاونت محترم بهداشتی  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

با سلام و احترام

احتراماً بدینوسیله گزارش نظام مراقبت بیماریهای آمیزشی مربوط به شش  
ماه اول سال جاری جهت استحضار و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

دکتر محمد مهدی گویا  
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

## گزارش مراقبت بیماریهای آمیزشی

شش ماهه اول سال ۱۳۸۷

### • گزارش‌های دریافتی

کامل بودن: از مجموع  $۴۱\times ۶=۲۴۶$  گزارش قابل دریافت، تعداد ۱۰۲ گزارش از طریق مکاتبه و ۷۶ گزارش از طریق نرم‌افزار دریافت گردید. در مجموع نسبت کامل بودن گزارشات  $\% ۷۱$  ( $۱۷۶/۲۴۶$ ) محاسبه گردید؛ نسبت کامل بودن گزارشات نرم‌افزاری  $\% ۳۰$  ( $۷۴/۲۴۶$ ) می‌باشد. دانشگاه‌های همدان، زنجان، اراک، کردستان، بابل، گناباد، سبزوار، خرم‌آباد کاملترین گزارشات ( $\% ۱۰۰$ ) را ارسال نموده‌اند. گزارشات دانشگاه‌های زابل، فسا، قزوین، گلستان، هرمزگان، یاسوج از ابتدای سال دریافت نگردیده است.

بهنگام بودن: بر اساس دستورالعمل، گزارشات بهنگام شامل گزارشاتی می‌باشد که تا بیستم ماه بعد به مرکز مدیریت بیماریها رسیده باشند. ۱۵۰ گزارش از  $۱۷۶$  گزارش ماهانه رسیده طی ۶ ماهه اول امسال بهنگام نبوده‌اند. نسبت بهنگام بودن گزارشات  $\% ۱۱$  ( $۲۶/۲۴۶$ ) محاسبه گردید. بهنگام‌ترین گزارشات متعلق به دانشگاه‌های بابل ( $\% ۸۲$ ) و همدان ( $\% ۶۷$ ) بوده است.

### • موارد گزارش شده

#### تعداد موارد گزارش شده بیماریهای آمیزشی به تفکیک دانشگاه

۶ ماهه اول ۱۳۸۷


دانشگاه	اوسر غیر وزیکولی												سیفیلیس-احتمالی			سیفیلیس-قطعی		
	ترشح مجرما						گنوره-قطعی						زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد
	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن
آذربایجان غربی	۲۳۰	۶۵۰۹					۸۳	۱۲۶۳	۸۱	۳۳	۱۵	۰	۰	۸۸۴	۱۴			
اصفهان	۲۵	۱۸۲					۲۳	۱۷۳	۲۳	۳۶	۴	۱	۰	۰	۰	۰		
ایلام	۲۰	۶۷۵					۲۳	۱۰۸	۸	۱۵	۴	۴	۱	۰	۰	۰		
بوشهر	۹۵	۲۵۴					۳۱	۲۰۵	۱۳	۲	۴	۱	۱	۴۳	۱۰			

کلامیدیا- قطعی	سیفیلیس- قطعی	سیفیلیس- احتمالی	گنوره- قطعی	ترشح مجرم	اولسر غیر وزیکولی	دانشگاه	
زن مرد	زن مرد	زن مرد	زن مرد	مرد	زن مرد		
۱ ۹۳۸	۰ ۱	۶ ۳۵	۳۰ ۱۸۸	۴۱۹	۷۰ ۲۶۸۹	تهران	۱۰
۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۱	۵۲	۱۰ ۵۱۶	چهارمحال و بختیاری	۱۲
۲۰ ۴۹۸	۰ ۰	۰ ۰	۱۶ ۸۱	۱۶۸	۹ ۲۴۶	خراسان شمالی	۱۴
۲ ۲۱	۰ ۰	۰ ۰	۱ ۲	۲	۱ ۰	رفسنجان	۱۶
۳ ۲۱	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۳	۳ ۴۲۹	سبزوار	۱۸
۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۱۷	۴۸ ۳۷۴	سیستان و بلوچستان	۲۰
۰ ۱	۰ ۰	۰ ۰	۱ ۰	۴	۰ ۱۷۱۰	شهید بهشتی	۲۲
۰ ۱۹	۱ ۱	۰ ۳	۱ ۰	۳۴	۰ ۴۵۳	قم	۲۴
۲ ۲۱۰	۰ ۲	۰ ۳۱	۵ ۲۹۴	۲۲۶	۱۶ ۹۸۱	کردستان	۲۶
۲ ۳۲۳	۲۰ ۱۷	۱ ۹	۵ ۴۰	۶۱۸	۶۶ ۱۰۰۶	کرمانشاه	۲۸
۴ ۱۸۶	۰ ۱	۱ ۰	۱۴ ۳۴	۱۵۳	۲۶ ۱۹۹۱	گیلان	۳۰
۱۹ ۱۳۳	۰ ۲	۱ ۰	۱۶ ۲۷	۱۹۰	۳۲ ۶۵۶	مازندران	۳۲
۴۰ ۳۹۱	۲ ۲۴	۷ ۳	۵۶ ۱۳۷	۳۸۵	۱۰۱ ۱۶۹۵	همدان	۳۴
۱۷۴ ۵۲۷۶	۲۵ ۷۰	۸۵ ۲۷۳	۶۵ ۱۶۳	۷۹۳۰	۲۰۷۲ ۳۲۹۶۷	جمع	

## ۱. اولسر غیر وزیکولی ژنیتال

در ۶ ماه اول سال جاری تعداد ۳۵۰۳۹ مورد اولسر غیر وزیکولی ژنیتال گزارش گردیده است؛ از این تعداد ۳۲۹۶۷ مورد آن مربوط به زنان می‌باشد. بر این اساس حداقل میزان بروز موارد در کل کشور ۴۹ در صد هزار نفر جمعیت برآورده گردید. دانشگاه‌های آذربایجان غربی (۲۲۲)، سبزوار (۲۲۲) و ایلام (۱۲۶) بالاترین و دانشگاه‌های اصفهان (۴۹)، کرمان (۵۸) و جهرم (۱۲۷) پایین‌ترین میزان بروز را در این مدت داشته‌اند. میزان بروز جنسی در کل کشور در زنان و مردان به ترتیب ۹۲ و ۶ در صد هزار نفر جمعیت محاسبه گردید. بیشترین میزان بروز در زنان در دانشگاه‌های آذربایجان غربی (۴۴۸)، سبزوار (۴۴۲)، ایلام (۴۴۵) و کمترین آن در دانشگاه‌های اصفهان (۸۶)، کرمان (۱۰۳)، جهرم (۲۵)؛ بیشترین میزان بروز در مردان در دانشگاه‌های لرستان (۴۸)، بوشهر (۲۱)، آذربایجان غربی (۱۶) و کمترین آن در دانشگاه‌های زنجان (۰)، شهید بهشتی (۰) و قم (۰) مشاهده می‌گردد. بیشترین مقدار نسبت میزان زن به مرد متعلق به دانشگاه‌های زنجان، شهید بهشتی و قم و کمترین آن متعلق به دانشگاه‌های بوشهر، لرستان و خوزستان بوده است.


روند موارد گزارش شده اولسر غیروزیکولی ژنیتال شش ماهه اول ۱۳۸۷



همانگونه که در نمودار فوق مشاهده می‌گردد تعداد موارد گزارش شده در زنان در ماه اردیبهشت ۵۴٪ افزایش نشان می‌دهد و پس از آن کاهش روند مشاهده می‌گردد. این پیک در نمودار ۲۲ دانشگاه از مجموع ۳۵ دانشگاه به چشم می‌خورد. دانشگاه‌های اراک (۴۱۴/۰)، شهرکرد (۱۴۷/۰)، خراسان

شمالی(۲۱۳/۱۷) بیشترین درصد افزایش و دانشگاه آذربایجان غربی با ۵۶٪ افزایش موارد، بیشترین تعداد افزایش(۱۲۲۳/۱۹۱۲) را در این ماه داشته‌اند.


مقایسه موارد گزارش شده اولسر غیر وزیکولی ژنیتال در شش ماهه اول ۱۳۸۷ با زمان مشابه در سال گذشته




## ۲. ترشح مجراء

تعداد موارد گزارش شده ترشح مجراء در مردان در دوره فوق ۷۹۳۰ مورد بوده است. این تعداد معادل با میزان بروز ۲۲ در صد هزار نفر جمعیت مردان می‌باشد. میزان بروز موارد ترشح مجراء در مردان ۱۵-۴۵ ساله، ۳۷/۵ در صدهزار نفر جمعیت این گروه سنی محاسبه گردید. بیشترین میزان بروز موارد در صد هزار نفر جمعیت در دانشگاه‌های لرستان(۱۱۹)، آذربایجان غربی(۸۷) و کرمانشاه(۶۵) و کمترین آن در دانشگاه‌های چهرم(۰)، شهیدبهشتی(۰/۲) و سبزوار(۳) مشاهده می‌گردد. لازم به ذکر است تعداد موارد گزارش شده از دانشگاه کرمانشاه مربوط به ۴ ماه اول سال می‌باشد.

### روند موارد گزارش شده ترشح مجراء در مردان شش ماهه اول ۱۳۸۷




مقایسه موارد گزارش شده ترشح مجراء در مردان در شش ماهه اول ۱۳۸۷ با زمان مشابه در سال گذشته




### ۳. گنوره قطعی

طی شش ماه اول سال جاری تعداد ۲۲۸۶ مورد گنوره از سراسر کشور گزارش گردیده است. از این تعداد ۱۶۲۴ مورد آن در زنان و ۶۵۲ مورد در مردان بوده است. بر این اساس حداقل میزان بروز موارد گنوره قطعی در کشور ۲/۲ و حداقل میزان بروز جنسی آن در زنان و مردان به ترتیب ۴/۶ و ۱/۸ در صد هزار نفر جمعیت برآورد می‌گردد. دانشگاههای کردستان(۲۱)، خراسان شمالی(۱۲) و همدان(۱۱) بالاترین و دانشگاههای بابل(۰)، جهرم(۰) و سبزوار(۰) پایین‌ترین میزان بروز را در این مدت داشته‌اند. بیشترین میزان بروز در زنان در دانشگاههای کردستان(۲۱)، خراسان شمالی(۲۰)، فارس(۱۷) و کمترین آن در دانشگاههای بابل(۰)، جهرم(۰)، سبزوار(۰)، شهریبدبهشتی(۰)، قم(۰)، اردبیل(۰)؛ بیشترین بروز در مردان در دانشگاههای شاهروند(۱۲/۵)، همدان(۴/۵)، خراسان رضوی(۶/۲) و کمترین آن در دانشگاههای بابل(۰)، جهرم(۰)، چهارمحال و بختیاری(۰)، سبزوار(۰)، لرستان(۰) مشاهده می‌گردد. بیشترین مقدار نسبت میزان زن به مرد متعلق به دانشگاههای چهارمحال و بختیاری، لرستان و کردستان و کمترین آن متعلق به دانشگاههای شهریبدبهشتی، قم و اردبیل بوده است. لازم به ذکر است موارد گزارش شده از دانشگاه خراسان شمالی و خراسان رضوی مربوط به سه ماه اول سال و کردستان ۴ ماه اول سال می‌باشد.

## روند موارد گزارش شده گنوره قطعی در مردان شش ماهه اول ۱۳۸۷



مقایسه موارد گزارش شده گنوره قطعی در شش ماهه اول ۱۳۸۷ با زمان مشابه در سال گذشته




## ۴. سیفیلیس اولیه و ثانویه احتمالی

تعداد ۲۵۸ مورد سیفیلیس اولیه و ثانویه احتمالی طی شش ماه اول امسال گزارش گردیده است؛ دانشگاه‌های بیرجند(۸/۷)، شاهروند(۴/۶) و ایلام(۲/۷) بالاترین میزان بروز موارد را در این مدت داشته‌اند. از کل موارد گزارش شده، ۲۷۳ مورد آن در زنان و ۸۵ مورد در مردان بوده است. میزان بروز موارد در زنان و مردان به ترتیب ۰/۸ و ۰/۲ در صد هزار نفر جمعیت در کشور برآورد گردید. دانشگاه‌هایی که بالاترین میزان بروز موارد در زنان را داشته‌اند عبارتند از بیرجند(۱۵)، ایلام(۵/۵) و

کردستان(۴/۲) و بالاترین میزان موارد در مردان از دانشگاههای شاهروند(۸/۳)، بیرجند(۲/۲) و آذربایجان غربی(۱/۰۳) گزارش شده است.


#### روند موارد گزارش شده سیفیلیس اولیه و ثانویه احتمالی شش ماهه اول ۱۳۸۷



#### ۵. سیفیلیس اولیه و ثانویه قطعی

طی مدت ۶ ماه اول امسال تعداد ۹۵ مورد سیفیلیس اولیه و ثانویه قطعی گزارش گردیده که ۷۰ مورد آن در زنان بوده است. بر این اساس حداقل میزان بروز موارد در کل کشور ۱۲/۰ در صد هزار نفر جمعیت و میزان بروز جنسی در زنان و مردان به ترتیب ۰/۰۷ و ۰/۰۲ در صد هزار نفر برآورده می‌گردد. دانشگاههای کرمانشاه(۲)، همدان(۱/۵) و شاهروند(۴) بالاترین میزان بروز موارد را داشته‌اند. بالاترین میزان بروز در زنان در دانشگاههای همدان(۲/۸)، کرمانشاه(۱/۸) و ایران(۰/۰۴) و در مردان در دانشگاههای کرمانشاه(۲/۱)، شاهروند(۰/۸) و همدان(۰/۲) بوده است. لازم به ذکر است موارد گزارش شده از دانشگاه کرمانشاه مربوط به چهار ماه اول سال می‌باشد.

## روند موارد گزارش شده سیفیلیس اولیه و ثانویه قطعی شش ماهه اول ۱۳۸۷




### ۶ کلامیدیا قطعی

تعداد کل موارد گزارش شده کلامیدیا قطعی طی شش ماه اول امسال ۵۴۵۰ مورد بوده است. بر این اساس میزان بروز موارد در کشور ۷/۶ در صد هزار نفر جمعیت برآورد می‌گردد. بالاترین میزان بروز موارد در صد هزار نفر جمعیت طی این دوره متعلق به دانشگاه‌های خراسان شمالی (۶۳)، ایلام (۵۱) و گناباد (۳۷) می‌باشد. تعداد موارد گزارش شده در زنان و مردان به ترتیب ۵۲۷۶ و ۱۷۴ مورد بوده است. این تعداد معادل با میزان بروز ۱۴/۷ و ۰/۵ در صد هزار نفر جمعیت می‌باشد. بالاترین میزان بروز در زنان و مردان متعلق به دانشگاه خراسان شمالی (۱۲۲ و ۴/۹) می‌باشد و پس از آن دانشگاه‌های ایلام (۱۰/۱) و گناباد (۷۲) بالاترین میزانهای بروز در زنان و دانشگاه‌های همدان (۴/۷) و سبزوار (۳/۱) بالاترین میزان بروز در مردان را داشته‌اند. همانگونه که بیشتر ذکر گردید موارد گزارش شده از دانشگاه خراسان شمالی مربوط به سه ماهه اول سال می‌باشد.

در روند کشوری پیک موارد در اردیبهشت ماه مشاهده می‌گردد که مشابه افزایش موارد در نمودار اولسر غیر وزیکولی ژنیتال می‌باشد. در این ماه، دانشگاه‌های خراسان شمالی، ایلام و گیلان بیشترین درصد افزایش موارد در زنان را داشته‌اند.

روند موارد گزارش شده کلامیدیا قطعی شش ماهه اول ۱۳۸۷



موارد کزارش شده بیماریها و سندروم‌های آمیزشی به تفکیک گروه‌های سنی و جنسی - شش ماهه اول ۱۳۸۷

مجموع		تشخیص									
		>۴۵	۴۰-۴۵	۳۵-۴۰	۳۰-۳۵	۲۵-۳۰	۲۰-۲۵	۱۵-۲۰	۱۰-۱۵	۵-۱۰	
۱۱۹۶۷	۱۱۷۷۴	۳۱۸	۵۹۸۶	۷۸۱	۷۸۷	۷۸۷	۷۹۲۲	۱۹۷۴	۷۵۰	۱۲۴	
۲۰۷۲	۸۰	۱۶۶	۲۷۸	۴۷۷	۵۱۵	۳۶۷	۷۶	۷۶	۷۶	۳۹	
۳۵۰۹	۱۶۱۳	۳۷۸	۶۲۶۴	۸۸۷	۸۷۲	۵۷۱	۱۶۱	۴۷۷۳	۳۰۴	۳۰	
۷۹۳۰	۲۸۲	۷۲۵	۱۱۵۳	۱۰۷۸	۱۸۷۴	۱۵۰۲	۵۱۱	۱۸۲	۱۱۷	۳۰	
۱۲۱۵	۱۶۹	۱۶۰	۲۲۳	۴۷	۲۲۵	۱۷۱	۱۶۹	۲۱۳	۸	۵	
۹۰۲	۷	۵۱	۴۴	۱۱۹	۱۱۹	۱۷۱	۹۲	۱۴	۲	۰	
۶۲۸۲	۱۰۷	۱۰۷	۲۱۶	۴۲۶	۴۲۰	۱۵۱	۳۰۳	۳۰۳	۱۰	۰	
۲۱۲۳	۱۲	۲۰	۳۰	۵۲	۸۷	۴۹	۹	۴	۵	۰	
۳۵۸	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۳	
۷۵	۱۸	۳۱	۳۲	۶۲	۱۱۳	۷۵	۱۳	۹	۸	۰	
۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹۵	۰	۱۱۳	۱۰۰	۳۳۳	۲۶۳	۱۶	۲	۱	۰	۰	
۵۱۱۷۶	۱۹۱	۴۴۴	۸۱۴	۱۱۶۱	۱۱۱۲	۸۴۶	۲۳۳۲	۲۳۳۲	۲۳۳	۳	
۱۷۵	۷	۱	۲۷	۲۵	۲۹	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	
۰۳۵۰	۲۰۱	۴۵۵	۹۱۱	۱۱۱۲	۱۱۱۱	۸۷۷	۲۵۶	۸۸	۲۵	۲۵	
کل مجموع		مجموع									
اولسر غیروزنکوئی زینبال		مجموع									
سیفیلیس اولیه و ثانویه احتمالی		مجموع									
بیفیلیس اولیه و ثانویه قطبی		مجموع									
کلامیدیا - قطبی		مجموع									

