

تب مالت چیست :

تب مالت یا بروسلوز یکی از بیماریهای عفونی قابل انتقال بین انسان و حیوان است

عامل بیماری:

عامل تب مالت میکروبی بنام بروسلا می باشد ، این بیماری معمولاً در بین حیوانات اهلی و بیشتر در بز ، گاو و گوسفند دیده می شود . این بیماری بیشتر در فصول بهار و تابستان یعنی در فصل زایش و شیر دهی دامها بروز می کند. نامهای دیگر این بیماری عبارتند از "تب موج" ، "تب دیوانه" و "تب مدیترانه ای" .

علائم بیماری:

بیماری ممکن است شدید یا خفیف با شروع تدریجی یا ناگهانی باشد . علائم شایع آن در انسان تب و لرز ، خستگی ، تعریق ، سردرد ، درد مفاصل و کمر ، بی اشتها ، کاهش وزن ، یبوست ، گلودرد و سرفه خشک می باشد. تظاهرات شایع آن در دامها سقط جنین است .

اهمیت بیماری:

بیماری تب مالت یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که علاوه بر ایجاد مشکلات جدی برای سلامت انسانها همواره تهدیدی است برای سرمایه صاحبان شاعل در دامپروری و گاو داری ها، از عوارض خطرناک این بیماری در انسان می توان به التهاب مفاصل، عفونت استخوان و لایه های داخلی قلب اشاره کرد که نیازمند درمانهای طولانی مدت با صرف هزینه های سنگین می باشد در دامها نیز موجب کاهش وزن ، کاهش تولید شیر و نیز سقط جنین می شود . بنابراین بیماری تب مالت به راحتی می تواند باعث هدر رفتن سرمایه های زیادی از جامعه می شود .

دوره نهفتگی:

دوره نهفتگی (کمون) تب مالت معمولاً بین یک تا سه هفته است اما گاهی به چند ماه می رسد.

راههای انتقال بیماری:

- مصرف شیر خام و فرآورده های لبنی تهیه شده از شیر خام یا شیری که به خوبی جوشیده نشده مخصوصاً پنیر محلی ، خامه، سرشیر و بستنی و
- تماس با خون، جفت، جنین، و ترشحات رحمی حیوان آلوده.
- تنفس هوای آغل و طویله دامهای آلوده .
- پاشیده شدن خون یا ترشحات دام آلوده به چشم.
- از طریق مادر آلوده به جنین و همینطور در حین شیردهی.

پیشگیری:

- از شیر و فرآورده های لبنی تهیه شده از شیر پاستوریزه یا شیری که به اندازه کافی جو شیده استفاده کنید.
- قبل از مصرف شیر را به مدت ۳ تا ۵ دقیقه بجوشانید باید توجه داشته باشیم که کف کردن شیر به هنگام حرارت دادن ، علامت جوشیدن شیر نمی باشد.
- نگهداری پنیر در آب نمک حداقل بمدت ۲/۵-۳ ماه
- افرادی که به نحوی با دام سرو کار دارند، باید به هنگام کار از وسایل حفاظتی مانند دستکش، عینک، چکمه و لباس غیر قابل نفوذ استفاده نمایند.
- مهمترین راه پیشگیری از تب مالت در حیوانات شناسایی و جدا کردن حیوانات آلوده است.

وضعیت بیماری تب مالت در استان لرستان:

به استناد موارد گزارش شده بیماری تب مالت از شهرستانهای مختلف استان در سال ۱۳۹۱ تعداد موارد گزارش شده به این معاونت بالغ بر ۱۰۰۰ مورد بوده که در میان چندین بیماری قابل انتقال بین حیوان و انسان در استان لرستان در رتبه اول قرار دارد و توزیع جغرافیایی آن در سطح استان به نحوی است که تمام شهرستانهای استان به این بیماری آلودگی داشته اما شهرستان هایی که از نظر دامپروری و تولید شیر و فرآورده های آن فعالیت بیشتری دارند از جمله شهرستان الیگودرز از میزان شیوع بالاتری برخوردارند . بر گرفته از دستورالعمل کشوری بیماری تب مالت